

ULTRAD[®] HA

AMM : N°2060177
Classement CLP : ⚠ SGH07, H319, ATTENTION
Composition : 4 % Acide Hydroxy acétique
Formulation : Poudre fumigène
Délai de Ré-entrée : 15 heures



> A retenir

Biocide TP04

Utilisable en présence de matériel et de palox

Fongicide, bactéricide, levuricide

Utilisable dans tout type de stockage de légumes

Egalement utilisable en bâtiment d'élevage (vide sanitaire)

Autorisé dans le domaine de la transformation biologique des aliments

> Ses Atouts

Système autonome, sûr pour l'opérateur : pas de présence humaine nécessaire

Pratique et rapide à utiliser

Non corrosif

Substance présente à l'état naturel dans les végétaux

Deux conditionnements : 400 et 1000 g

Laurent
Sarl TERNYNCK

61 rue de derrière - 62136 LESTREM (France)

Tel : +33 626 803 168

contact@potatoter.com

www.potatoter.com

ULTRAD HA

> Dosage

Type de désinfection	Dosage (g/m ³)	Volume désinfecté par boîte de 400 g (m ³)	Volume désinfecté par boîte de 1000 g (m ³)
Local vide	0,8	500	1250
Local avec palox et / ou matériel	1	400	1000

> Mise en œuvre

1 Lavage complet du bâtiment y compris système de ventilation / réfrigération	2 Laisser sécher	3 Traiter hors présence humaine et animale, hors présence de denrées alimentaires	4 Stopper les ventilations.
5 Fermer hermétiquement la chambre et débrancher les éventuels détecteurs de fumée	6 Calfeutrer les éventuelles entrées d'air.	7 Protéger les cellules photoélectriques et les sondes hygrométriques.	8 Température minimale : 9°C - idéale : 20°C.
9 Hygrométrie entre 50 et 95 %.	10 Décompacter la poudre et répartir le nombre de boîtes nécessaires selon le volume à traiter	11 Disposer les boîtes au sol, sur support résistant à la chaleur, loin de tout matériau combustible	12 Ouvrir la boîte et allumer la mèche à l'aide d'un briquet type chalumeau en commençant par la boîte la plus éloignée de la sortie
13 Quitter le local en s'assurant du bon fonctionnement du produit et maintenir le local clos	14 Procéder à une ventilation interne de 10 minutes à la fin du traitement pour une bonne répartition.	15 Signaler le traitement à tous les accès	16 Délai de réentrée : 15 heures. Ventiler pendant une période de 30 minutes à une heure les zones traitées avant d'y accéder

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Laurent
Sarl TERNYNCK

61 rue de derrière - 62136 LESTREM (France)

Tel : +33 626 803 168

contact@potatoter.com

www.potatoter.com